



フェロモントラップ等調査データ（オオタバコガ）

令和6年4月19日
埼玉県病虫害防除所


1 調査期間

令和6年4月¹～令和6年11月

2 調査地点

本庄市児玉町小平、深谷市針ヶ谷（旧：山河）、越谷市中島、杉戸町大塚
※本年度より誘殺法を粘着板トラップから、ファネルトラップに変更した。


3 データ



※グラフ補足：4月第1半旬誘殺数0.8、4月第2半旬誘殺数0.7

¹ 近年の暖冬傾向を鑑みて、令和6年より3月からの調査を開始した。


オオタバコガ誘殺消長
(対象作物:露地野菜 調査地点:深谷市針ヶ谷(旧:山河))



5日間移動平均値データ 4~11月(第1半旬~第6半旬/月)

※グラフ補足：4月第1半旬誘殺数 1.3、4月第2半旬誘殺数 1.1


オオタバコガ誘殺消長
(対象作物:ネギ 調査地点:越谷市中島)



5日間移動平均値データ 4~11月(第1半旬~第6半旬/月)

※グラフ補足：4月第1半旬誘殺数 0、4月第2半旬誘殺数 0

オオタバコガ誘殺消長
 (対象作物:露地ナス 調査地点:杉戸町大塚)



5日間移動平均値データ

4~11月(第1半旬~第6半旬/月)

※グラフ補足：4月第1半旬誘殺数 2.5、4月第2半旬誘殺数 0.9