



コバトン



彩の国
埼玉県

フェロモントラップ等調査データ（イネカメムシ）

令和 7 年 8 月 2 1 日
埼玉県病害虫防除所

1 調査期間

令和 7 年 6 月～令和 7 年 9 月

2 調査地点

（1）白熱電球予察灯（水稻各種害虫調査用）


川越市南田島、川島町上八ツ林、本庄市児玉町吉田林、
熊谷市玉井（玉井試験場）、加須市大越、春日部市樋籠



（2）水銀灯予察灯（果樹カメムシ類調査用）



上里町長浜、春日部市内牧、久喜市六万部（久喜試験場）


3 データ

（1）白熱電球予察灯（平年値は、各地で本虫の誘殺が始まった R3～R5 の 3 年間）











※春日部市は R2 から誘殺が始まったが、R3 は未調査のため R2, R4, R5, R6 の 4 年間

(2) 水銀灯予察灯 (令和 6 年から調査)




イネカメムシ誘殺消長
(対象作物: 水稻 調査地点: 春日部市内牧)



5日間移動平均値データ

6～9月(第1半旬～第6半旬／月)

イネカメムシ誘殺消長
(対象作物: 水稻 調査地点: 久喜試験場)



5日間移動平均値データ

6～9月(第1半旬～第6半旬／月)