



フェロモントラップ等調査データ（果樹カメムシ）

令和 7 年 6 月 6 日
埼玉県病虫害防除所


1 調査期間

フェロモントラップ(水盤)：令和 7 年 4 月～令和 7 年 10 月
予察灯：令和 7 年 4 月～令和 7 年 10 月


2 調査地点及び方法

寄居町鉢形：フェロモントラップ(水盤)
春日部市内牧、久喜市六万部（久喜試験場）、上里町長浜：予察灯

3 データ



果樹カメムシ類誘殺消長
(対象作物:なし 調査地点:春日部市内牧)




5日間移動平均値データ

4～10月(第1半旬～第6半旬/月)

※グラフ補足 4月：第2半旬誘殺数 0、第3半旬誘殺数 0.8、
第4半旬誘殺数 0.8、第5半旬誘殺数 0.4、第6半旬誘殺数 0、
5月：第1半旬誘殺数 0、第2半旬誘殺数 0、第3半旬誘殺数 2.2

果樹カメムシ類誘殺消長
(対象作物:なし 調査地点:久喜試験場)




5日間移動平均値データ

4～10月(第1半旬～第6半旬/月)

※グラフ補足 4月：第3半旬誘殺数 0、第4半旬誘殺数 1.4、
第5半旬誘殺数 0.8、第6半旬誘殺数 0.8、
5月：第1半旬誘殺数 0.6、第2半旬誘殺数 0.8、第3半旬誘殺数 4.0

果樹カメムシ類(チャバネ、クサギ、ツヤアオ)誘殺消長
(対象作物:ナシ 調査地点:上里町長浜)



5日間移動平均値データ

4~10月(第1半旬~第6半旬/月)