



フェロモントラップ等調査データ（オオタバコガ）

令和 7 年 5 月 2 6 日
埼玉県病虫害防除所


1 調査期間

令和 7 年 4 月¹～令和 7 年 1 1 月

2 調査地点

本庄市児玉町小平、深谷市針ヶ谷（旧：山河）、越谷市中島、杉戸町大塚
※本年度より誘殺法を粘着板トラップから、ファネルトラップに変更した。


3 データ



※グラフ補足：4月第4半旬誘殺数 3.0、4月第5半旬誘殺数 3.6、
4月第6半旬誘殺数 26.1、5月第1半旬誘殺数 26.7、
5月第2半旬誘殺数 23.7、5月第3半旬誘殺数 20.6

¹ 近年の暖冬傾向を鑑みて、令和 6 年より 3 月からの調査を開始した。


オオタバコガ誘殺消長
(対象作物:露地野菜 調査地点:深谷市針ヶ谷(旧:山河))



5日間移動平均値データ

4～11月(第1半旬～第6半旬／月)

※グラフ補足：4月第4半旬誘殺数 30.3、4月第5半旬誘殺数 39.5、
4月第6半旬誘殺数 82.6、5月第1半旬誘殺数 176.6、
5月第2半旬誘殺数 238.7、5月第3半旬誘殺数 312.0



※グラフ補足：4月第1半旬誘殺数 0.0、4月第2半旬誘殺数 0.3
 4月第3半旬誘殺数 0.6、4月第4半旬誘殺数 1.4、
 4月第5半旬誘殺 0.8、4月第6半旬誘殺数 14.0、
 5月第1半旬誘殺数 14.5、5月第1半旬誘殺数 14.5、
 5月第2半旬誘殺数 14.6、5月第3半旬誘殺数 10.8

