



フェロモントラップ等調査データ（オオタバコガ）

令和8年6月19日
埼玉県病害虫防除所


1 調査期間

令和8年4月¹～令和8年11月

2 調査地点


本庄市児玉町小平、深谷市針ヶ谷（旧：山河）、越谷市中島、杉戸町木野川
※令和6年度より誘殺法を粘着板トラップから、ファネルトラップに変更した。

3 データ



¹ 近年の暖冬傾向を鑑みて、令和6年より3月からの調査を開始した。


オオタバコガ誘殺消長
 (対象作物:露地野菜 調査地点:深谷市針ヶ谷(旧:山河))



5日間移動平均値データ

4~11月(第1半旬~第6半旬/月)

オオタバコガ誘殺消長
 (対象作物:ネギ 調査地点:越谷市中島)



5日間移動平均値データ


4~11月(第1半旬~第6半旬/月)

※グラフ補足

5月: 第4半旬誘殺数 1.8、第5半旬誘殺数 4.2、第6半旬誘殺数 4.6

6月: 第1半旬誘殺数 1.4、第2半旬誘殺数 1.0

オオタバコガ誘殺消長
 (対象作物:露地ナス 調査地点:杉戸町木野川)



5日間移動平均値データ 4~11月(第1半旬~第6半旬/月)

※グラフ補足

5月：第4半旬誘殺数 1.5、第5半旬誘殺数 3.6、第6半旬誘殺数 4.6
 6月：第1半旬誘殺数 4.4、第2半旬誘殺数 3.8

※令和7年まで杉戸町大塚で調査、令和8年から杉戸町木野川で調査