



フェロモントラップ等調査データ（オオタバコガ）

令和 8 年 7 月 22 日
埼玉県病害虫防除所

1 調査期間


令和 8 年 4 月¹～令和 8 年 11 月

2 調査地点

本庄市児玉町小平、深谷市針ヶ谷（旧：山河）、越谷市中島、杉戸町木野川


※令和 6 年度より誘殺法を粘着板トラップから、ファネルトラップに変更した。

3 データ



¹ 近年の暖冬傾向を鑑みて、令和 6 年より 3 月からの調査を開始した。


オオタバコガ誘殺消長
(対象作物:露地野菜 調査地点:深谷市針ヶ谷(旧:山河))



5日間移動平均値データ

4～11月(第1半旬～第6半旬／月)

オオタバコガ誘殺消長
(対象作物:ネギ 調査地点:越谷市中島)




5日間移動平均値データ

4～11月(第1半旬～第6半旬／月)

※グラフ補足

6月：第4半旬誘殺数 3.4、第5半旬誘殺数 3.8、第6半旬誘殺数 3.6

7月：第1半旬誘殺数 0.9、第2半旬誘殺数 0.0



※グラフ補足

6月：第4半旬誘殺数 4.9、第5半旬誘殺数 5.3、第6半旬誘殺数 5.3

7月：第1半旬誘殺数 4.8、第2半旬誘殺数 4.6

※令和7年まで杉戸町大塚で調査、令和8年から杉戸町木野川で調査