

リスク表（入院調整用）

	項目	スコア
検査所見 及び症状	酸素飽和濃度（SpO ₂ ） 90%未満	7点
	90～93%	6点
	94～95%	2点
	肺炎像（X-P・CT）が広範囲（両肺かつ2分の1以上）	6点
	広範囲ではない	2点
	37.5度以上の発熱が6日以上持続（又は38度以上が3日持続） *発熱は、解熱剤使用の有無を問わず持続している場合を指す。	3点
	呼吸苦又は激しい咳症状の持続	2点
食欲不振や下痢等で脱水を伴っている可能性が高い場合	2点	



	リスク因子	スコア
基礎疾患等	妊娠37週以降の妊婦	6点
	透析	
	免疫抑制剤使用中	
	悪性腫瘍に罹患して治療中	
	65歳以上	2点
	肥満（BMI>25（ただし、BMI≥30）は「3点」とする）	2点（3点）
	造血幹細胞移植・骨髄移植・原発性免疫不全・HIV（CD4<200/μL）	1点
	糖尿病（ただし、コントロール不良時（HbA1c>8.0%）は「3点」とする）	2点（3点）
	睡眠時無呼吸症候群（SAS）	1点
	慢性呼吸器疾患（気管支喘息含む）	2点
	重症の心血管疾患（冠動脈疾患、心筋症など心不全を伴う）	2点
	高度慢性腎臓病（GFR30未満が目安）	3点
	コントロール不良高血圧	2点
ワクチン未接種又は2回接種が終了していない場合	2点	



	項目	スコア
その他	男	1点
	単身者	1点

有症状かつスコア合計3点*以上は入院調整対象

*ただし、「その他」のみ点数が入る場合は、対象外とする。

感染拡大期となった場合は6点以上を入院調整対象とする

ただし、スコアの点数によらず医師が入院を必要と判断する場合は入院調整を行う。

