

水稻の斑点米カメムシ類の畦畔・雑草地発生調査結果

令和8年7月22日 埼玉県病害虫防除所



- 1 調査年月日:7月中旬頃を基準として調査した。
- 2 調査場所:原則として従前から実施してきた調査地点(畦畔・雑草地・土手等)
- 3 調査項目等:斑点米カメムシ類の幼虫・成虫別に計数調査した。
次表のとおり。(調査地点、調査日、カメムシ類別、調査場所の状況(雑草の種類、草丈などの管理状況等)
- 4 具体的な調査方法:径36cm捕虫網による10往復・20回振り調査。

*別和名：アカヒゲホソミドリカスミカメ																	主な斑点米カメムシ類(表中出現順)		
調査年月日		調査地点／種類	イネホソミドリカスミカメ*		アカスジカスミカメ		クモヘリカメムシ		ホソハリカメムシ		シラホシカメムシ		トゲシラホシカメムシ		その他		合計 頭	参考 前年 (R7年)	備 考 (雑草などの管理状況等)
			幼虫	成虫	幼虫	成虫	幼虫	成虫	幼虫	成虫	幼虫	成虫	幼虫	成虫	幼虫	成虫			
令和																			
8年	7月10日	川越市小中居	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	53	メヒシバ主体
8年	7月10日	坂戸市横沼	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	109	オヒシバ、メヒシバ主体
8年	7月10日	毛呂山箕和田	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	セイバンモロコシ主体、水田外周の畦畔雑草は除草済のため、道路に面した畦畔で調査
8年	7月10日	嵐山町吉田	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	イヌビエ主体+ホソムギ+エノコログサ
8年	7月10日	嵐山町杉山	0	2	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	20	211	R8ダイズ定点貯水池付近、イヌビエ主体+ホソムギ、その他（イネカメムシ成4, 幼1）
8年	7月8日	川島町曲師	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	272	用水路沿い、タイヌビエ主体+メヒシバ+ホソムギ
8年	7月8日	吉見町西吉見	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	メヒシバ主体
8年	7月13日	本庄市児玉町吉田林	14	164	0	44	0	2	0	28	0	2	0	0	0	0	254	1	メヒシバ主体+エノコログサ、イヌビエ
8年	7月13日	美里町小茂田 1	32	16	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	24	メヒシバ主体
8年	7月13日	美里町小茂田 2	25	81	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119	35	メヒシバ主体
8年	7月8日	熊谷市中曽根 1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	4	45	フタオビコヤガフェロモントラップ付近、メヒシバ主体+ノビエ類+ホソムギ、その他(イネクロ)
8年	7月10日	熊谷市中曽根 2	18	18	9	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	48	311	畦畔（大里中付近）、メヒシバ主体
8年	7月10日	熊谷市桶春	23	41	7	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	76	73	雑草地（R7ダイズ定点付近）、メヒシバ+イネムギ
8年	7月10日	熊谷市板井	4	15	0	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	24	56	R8ダイズ定点付近、メヒシバ主体
8年	7月10日	行田市前谷	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	244	畦畔、メヒシバ+クローバー
8年	7月10日	加須市麦倉	33	7	1	0	0	0	2	3	0	1	0	0	5	2	54	43	雑草地、メヒシバ+エノコログサ、その他（アカヒメヘリカメムシ成2・ブチヒゲカメムシ幼5）
8年	7月10日	加須市大越	0	0	3	5	0	0	8	15	2	1	0	0	0	0	34	1	畦畔、メヒシバ+エノコログサ
8年	7月10日	加須市間口	3	7	1	3	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	18	27	畦畔、メヒシバ+クローバー、その他（アカヒメヘリカメムシ成2・ブチヒゲカメムシ幼1）
8年	7月10日	幸手市神扇	7	4	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	21	メヒシバ主体
8年	7月10日	春日部市桶籠	3	1	2	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	9	22	メヒシバ・エノコログサ主体
8年	7月10日	吉川市中井	11	10	17	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	42	メヒシバ・エノコログサ主体
合計		調査地点数：21	173	396	43	103	0	3	11	56	2	6	0	0	7	9	809	1,741	発生地点率 18/21地点 85.7%
平均		1地点あたり頭数	8.2	18.9	2.0	4.9	0.0	0.1	0.5	2.7	0.1	0.3	0.0	0.0	0.3	0.4	38.5	82.9	

過去のデータ

調査年月日	調査地点／種類	イネホソミドリ カスミカメ*		アカスジ カスミカメ		クモヘリ カメムシ		ホソハリ カメムシ		シラホシ カメムシ		トゲシラホシ カメムシ		その他		合計 頭	発生地 点率 %	備 考 (調査地点のうち斑点米カメムシの発生地点数)
		幼虫	成虫	幼虫	成虫	幼虫	成虫	幼虫	成虫	幼虫	成虫	幼虫	成虫	幼虫	成虫			
平成																		
28年 7月上旬	15調査地点	8	32	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	44	73.3%	発生地点 11/15地点
	1地点あたり平均	0.5	2.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	-	-
29年 7月上旬	22調査地点	17	64	0	0	0	0	2	6	0	0	0	1	9	1	100	77.2%	発生地点 17 /22地点
	1地点あたり平均	0.8	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	4.5		平成29年7月3日に、平成29年度病害虫発生予察注意報第1号「斑点米カメムシ類(特に、アカヒゲホソミドリカスミカメ、アカスジカスミカメ)」を公表
30年 7月上旬	17調査地点	31	97	1	12	0	1	0	4	0	0	0	2	0	0	148	58.8%	発生地点 10/17地点
	1地点あたり平均	1.8	5.7	0.1	0.7	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	8.7	-	-
元年 7月上旬 (令和)	17調査地点	200	210	0	1	1	0	19	10	1	3	0	0	0	0	445	82.4%	発生地点 14/17地点
	1地点あたり平均	11.8	12.4	0.0	0.1	0.1	0.0	1.1	0.6	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	26.2	-	-
2年 7月上旬 (令和)	17調査地点	52	94	9	14	0	11	1	13	0	1	0	1	0	14	210	100.0%	発生地点 17/17地点
	1地点あたり平均	3.1	5.5	0.5	0.8	0.0	0.6	0.1	0.8	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.8	12.4	-	-
3年 7月上旬 (令和)	17調査地点	21	87	0	12	0	2	3	27	0	1	0	1	0	0	154	100.0%	発生地点 17/17地点
	1地点あたり平均	1.2	5.1	0.0	0.7	0.0	0.1	0.2	1.6	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	9.1	-	-
4年 7月上旬 (令和)	17調査地点	107	240	30	41	0	0	1	13	0	1	1	1	2	2	439	88.2%	発生地点 15/17地点
	1地点あたり平均	6.3	14.1	1.8	2.4	0.0	0.0	0.1	0.8	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	25.8	-	-
5年 7月上旬 (令和)	18調査地点	336	291	175	160	0	0	26	42	20	8	0	4	8	20	1,090	100.0%	発生地点 18/18地点
	1地点あたり平均	18.7	16.2	9.7	8.9	0.0	0.0	1.4	2.3	1.1	0.4	0.0	0.2	0.4	1.1	60.6	-	-
6年 7月上旬 (令和)	21調査地点	77	263	39	171	1	1	23	83	11	12	0	1	5	38	725	100.0%	発生地点率 21/21地点
	1地点あたり平均	3.7	12.5	1.9	8.1	0.0	0.0	1.1	4.0	0.5	0.6	0.0	0.0	0.2	1.8	34.5		
7年 7月上旬 (令和)	26調査地点	164	479	419	671	5	8	23	79	11	18	1	1	12	40	1,931	100.0%	発生地点率 26/26地点
	1地点あたり平均	6.3	18.4	16.1	25.8	0.2	0.3	0.9	3.0	0.4	0.7	0.0	0.0	0.5	1.5	74.3		
平成	1地点あたり平均	5.4	9.5	3.0	4.8	0.0	0.1	0.5	1.4	0.2	0.2	0.0	0.1	0.2	0.5	25.9	88.0%	