



国内22例目(鳥取1例目)

鳥取県の採卵鶏農場で 高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜確認!!

農場所在地：鳥取県鳥取市
飼養羽数：約11万羽

【経緯】

- 鳥取県は、11月30日(水)、「死亡羽数が増加している」との通報を受け、農場への立入検査を実施した。
- 農場での簡易検査が陽性であったため、遺伝子検査を実施した結果、12月1日(木)、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜であることを確認した。

※ 引き続き下記の衛生管理をお願いします。

◎毎日の健康観察

死亡羽数の増加(1日の死亡率が過去3週間の平均の2倍以上)

- ※ 死亡率が2倍未満であっても、通常と異なる症状(まとまって死亡している、元気がない、餌食いが悪い、沈うつ等)、生産面での異状(産卵率の低下等)にも注意してください!

◎飼養衛生管理基準の遵守の徹底

- ・ 衛生管理区域、家きん舎に立ち入る際の手指消毒
- ・ 家きん舎ごとの専用衣服と長靴の着用
- ・ 出入りする車の消毒
- ・ 防鳥ネットの破損有無の確認、修繕
- ・ ネズミ等の小動物対策、駆除
- ・ 農場周辺への消石灰散布

ウイルスの侵入リスクが高まっています!!
農場への侵入を防ぐため、確実に消毒を実施してください!!

◎異状を発見したら、直ぐに家畜保健衛生所に通報!!

⇒ 048-521-1274

農場周辺の高病原性鳥インフルエンザのウイルスが非常に多くなっています！

全国的に高病原性鳥インフルエンザの発生が確認されています。

これまで以上に、本病の発生予防を徹底しましょう！

家きん舎への人や、野生動物によるウイルスの侵入を防ぐことが特に重要です！

発生予防対策の特に重要なポイント

- 農場内や家きん舎周囲の消毒は毎日行いましょう！
- 家きん舎等への出入り時に消毒の実施・長靴の交換が適切にできているか、動線が交差していないか、今一度、点検・確認をお願いします！
- 長靴はしっかり汚れを落としてから消毒し、踏込消毒槽などの消毒薬は少なくとも毎日、汚れたらその都度、交換しましょう！
- 農場内や家きん舎の周囲にはウイルスが侵入する経路が多く存在していますので、今一度、点検・確認をお願いします！

ため池等の水場を意識し、その近くは徹底して消毒！

衛生管理区域内の野生動物対策



農場内や家きん舎周囲の消毒は毎日実施

家きん舎入口の人・物対策



専用長靴の設置
交差汚染防止



消毒薬は毎日
又は汚れたら
その都度交換



長靴は汚れを
落としてから消毒

衛生管理区域入口の人・車両・物対策



専用の服・車両・手指・
長靴の使用 物品消毒の徹底

家きん舎

家きん舎の野生動物対策



集卵ベルト等の
開口部の隙間対策



防鳥ネットや
鶏舎破損の補修

◆ 飼養家きんの毎日の健康観察を念入りに行い、異状を見つけた場合は、直ちに最寄りの家畜保健衛生所に連絡してください。

農林水産省HP「鳥インフルエンザに関する情報」→

