

2026年 粳水分の状況

気象庁発表の1か月予報では今後高温が予報されており、収穫期の前進が予想されます。  
高温時には玄米の成熟よりも帯緑色粳の減少が遅れることがあるため、刈り遅れないよう粳水分を確認し、25%になったら収穫を開始しましょう。

「コシヒカリ」(5月1日植)の8月24日(出穂後34日)現在の状況

- ・粳水分は25.6%です。
- ・玄米は青未熟粒がやや多いですが、登熟は進んでおり、収穫期間近です。
- ・ほ場を観察し、倒伏や登熟ムラの大きい箇所は刈り分けを計画する等、収穫の準備を行いましょう。

粳水分測定結果(玉井試験場内ほ場)

| 移植期・品種         | 出穂期   |                    | 測定日   |       |       |       |
|----------------|-------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
|                |       |                    | 8月17日 | 8月20日 | 8月24日 | 8月27日 |
| 5月1日植<br>コシヒカリ | 7月21日 | 出穂後日数(日)           | 27    | 30    | 34    |       |
|                |       | 出穂期～測定前日までの積算気温(℃) | 729   | 812   | 923   |       |
|                |       | 粳水分(%)             | 28.0  | 26.6  | 25.6  |       |
|                |       | 帯緑粳割合(%)           | 65    | 49    | 27    |       |

\*(参考)早期栽培コシヒカリの収穫適期の目安  
登熟積算気温950～1150℃、帯緑粳割合15～10%



○5月1日植「コシヒカリ」、出穂後34日(8月24日)の玄米(篩目1.8mm)