



事故のときの対応

誤飲(変なものを飲み込んだ)



中毒110番 p.30
たばこ専用電話 p.30
#7119番で症状の相談 p.29

- 意識がない。
(けいれんを起こしている。)
- 息が苦しそう。

該当する

119番 救急車を呼ぶ!



該当
しない

- ボタン電池 磁石
- 灯油 ベンジン マニキュア
- 除光液 洗剤 漂白剤
- しょうのう(衣類用防虫剤)
- たばこ 医薬品
- ホウ酸団子(ゴキブリ誘引殺虫剤)
- パラジクロロベンゼン
(衣類用防虫剤やトイレの芳香剤)
- ナフタリン(衣類用防虫剤)

- ・ 休日急患診療所
- ・ 救急医療機関



異物を取り除き、しばらく様子を見る。

(連休や年末年始のときは、翌日に休日急患診療所や救急医療機関を受診してください。)

ただし

症状が大きく変わった場合は休日急患診療所や救急医療機関を受診してください。

観察ポイント

- ① 顔色、意識、呼吸、脈拍を観察しましょう。
- ② 「何を」「どのくらい」「いつ」飲んだのかメモしましょう。
- ③ 原則、吐かせる必要はありません。
- ④ 牛乳、水などを無理に飲ませる必要はありません。